Erhebungsbogen für Tuberkulose

Zur Verwendung im Gesundheitsamt bei Tuberkulose-Meldefällen

Patient/Patientin Geburtsdatum: .....(tt/mm/jjjj) ❍ Männlich ❍ Weiblich ❍ Divers

Name: ..... Vorname: .....

Adresse: ……..

Geburtsland: ……. Staatsangehörigkeit: …….

Jahr der Einreise .....

Justizvollzugsanstalt ❍ Ja, von ..... bis .....

❍ Nein ❍ nicht ermittelbar

Verstorben ❍ Nein ❍ Ja, am ..... ❍ nicht ermittelbar

Todesursache ❍ an der gemeldeten Krankheit ❍ aufgrund anderer Ursache ❍ nicht ermittelbar

Todesursache: Gemäß Angaben auf der Todesbescheinigung (Teil I a bis c). Sofern die übermittelte Krankheit nicht als Teil der zum Tod führenden Kausalkette genannt ist, sollte ‚aufgrund anderer Ursache' angekreuzt werden. Bitte auch beim Behandlungsergebnis angeben.

Hospitalisierung ❍ Nein ❍ Ja, von ..... bis ..... ❍ nicht ermittelbar

Hospitalisierungsgrund ❍ aufgrund der gemeldeten Krankheit ❍ aufgrund anderer Ursache ❍ nicht ermittelbar

Status gemäß IfSG

❍ Betreut in Gemeinschaftseinrichtung nach § 33
❍ Betreut in Einrichtung nach § 35,36
❍ Untergebracht in Einrichtung nach § 23
❍ Ohne
❍ Tätigkeit in Einrichtung gemäß § 33
❍ Tätigkeit in Einrichtung nach § 35,36
❍ Tätigkeit in Einrichtung gemäß § 23
❍ nicht ermittelbar

Klinische Informationen Erkrankungsbeginn: ..... (falls bekannt)

Ärztliche Diagnose einer behandlungsbedürftigen TB ❍ Ja ❍ Nein

Behandlung eingeleitet ❍ Ja, am ..... ❍ Dreifachtherapie ❍ Vierfachtherapie

❍ Nein ❍ nicht ermittelbar

Symptomatik ☐ Husten ☐ Gewichtsabnahme ☐ Fieber ☐ Nachtschweiß ☐ Schwäche

☐ Sonstige: …….

Begleiterkrankungen ☐ Diabetes ☐ Immunsuppression ☐ Suchterkrankung ☐ psychiatrische Erkrankung

☐ HIV ☐ Sonstige:……..

Anlass der Diagnosestellung

❍ Abklärung tuberkulosebedingter Symptome
❍ Umgebungsuntersuchung
❍ Obduktion oder andere postmortale Untersuchung
❍ Überwachung gesunder Befundträger nach früherer Tuberkulose
❍ Aufenthaltsberechtigung für ausländische Staatsbürger/innen

Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft für:
❍ Asylbewerber/innen
❍ Aussiedler/innen
❍ Geflüchtete

Aufnahme in:
❍ Alten- oder Pflegeheim
❍ Obdachlosenheim
❍ Justizvollzugsanstalt

❍ nicht ermittelbar
❍ sonstiger Anlass:
……..

Hauptsächlich an Tuberkulose erkranktes Organ

❍ Lunge (Parenchym, Bronchialbaum, Kehlkopf)
❍ Pleura
❍ Lymphknoten, intrathorakal
❍ Lymphknoten, extrathorakal
❍ anderes Organ:……..
❍ Wirbelsäule
❍ sonstige Knochen u. Gelenke
❍ Hirnhaut
❍ sonstige ZNS
❍ Urogenitaltrakt
❍ Peritoneum, Verdauungstrakt
❍ Disseminierte Tuberkulose
❍ nicht ermittelbar

Zusätzlich an Tuberkulose erkranktes Organ *(Lunge ist immer als hauptsächlich erkranktes Organ anzugeben.)*

- ❍ Pleura
- ❍ Lymphknoten, intrathorakal
- ❍ Lymphknoten, extrathorakal
- ❍ kein weiteres Organ betroffen
- ❍ anderes Organ:……..
- ❍ Wirbelsäule
- ❍ sonstige Knochen u. Gelenke
- ❍ Hirnhaut
- ❍ sonstige ZNS
- ❍ Urogenitaltrakt
- ❍ Peritoneum, Verdauungstrakt
- ❍ Disseminierte Tuberkulose
- ❍ nicht ermittelbar

Vorerkrankung an Tuberkulose

❍ Nein (Ersterkrankung) ❍ Ja (Vorerkrankung bekannt) ❍ nicht ermittelbar

Jahr der Diagnose der (letzten) Vorerkrankung an Tuberkulose .....

Antituberkulöse Vorbehandlung ❍ Nein (nicht erfolgt) ❍ Ja (erfolgt) ❍ nicht ermittelbar

Vorbehandlung: mindestens einmonatige Behandlung mit einer Kombination von mindestens 3 Antituberkulotika, die auf Heilung einer Tuberkulose-Erkrankung ausgerichtet war, nicht die prophylaktische oder präventive Behandlung (Chemoprohylaxe, Chemoprävention).

Erfolg der Vorbehandlung

- ❍ Vollständige Behandlung mit Nachweis einer negativen Kultur
- ❍ Vollständige Behandlung ohne Nachweis einer negativen Kultur
- ❍ nicht ermittelbar
- ❍ Abbruch der Behandlung[1]
- ❍ Versagen der Behandlung[2]

Behandlungsergebnis der aktuellen Behandlung *(sobald bekannt; sonst Ermittlung 12–15 Monate nach Behandlungsbeginn)*

- ❍ Vollständige Behandlung mit Nachweis einer negativen Kultur
- ❍ Vollständige Behandlung ohne Nachweis einer negativen Kultur
- ❍ Fortführung der Behandlung nach ≥12 Monaten, Ergebnis folgt noch
- ❍ Unbekannt, da Person ins Ausland oder unbekannt verzogen
- ❍ nicht ermittelbar
- ❍ Abbruch der Behandlung[1]
- ❍ Versagen der Behandlung[2]
- ❍ Behandlungsverweigerung
- ❍ Versagen der Behandlung

Tod während der Behandlung: ❍ an Tuberkulose ❍ aufgrund anderer Ursache

Tod vor Beginn der Behandlung: ❍ an Tuberkulose ❍ aufgrund anderer Ursache

[1] Abbruch: Behandlungsunterbrechung über mehr als 2 aufeinanderfolgende Monate; [2] Versagen: 5 Monate nach Behandlungsbeginn andauernde –oder nach kultureller Konversion erneute- kulturell nachweisbare Ausscheidung des M. tuberculosis-Komplexes.

Bei Abbruch, Versagen oder vollständiger Behandlung ist der Datensatz abzuschließen. Bei erneuter Behandlung wird ein neuer Datensatz angelegt und die abgeschlossene Behandlung als Vorerkrankung berücksichtigt.

Labordiagnostischer Nachweis

Erreger

- ❍ *M. tuberculosis*
- ❍ *M. tuberculosis* Komplex, nicht differenziert
- ❍ *M. africanum*
- ❍ *M. canetti*
- ❍ *M .microti*
- ❍ *Mycobacterium pinnipedii*
- ❍ *M. bovis*
  - ❍ *M. bovis bovis*
  - ❍ *M. bovis caprae*

❍ Andere: ……..

Mikroskopie

☐ Sputum

- ❍ Nachweis säurefester Stäbchen (positiv)
- ❍ kein Nachweis säurefester Stäbchen (negativ)
- ❍ durchgeführt, aber Ergebnis unbekannt
- ❍ kein Nachweis durchgeführt

☐ weiteres Material: ……

- ❍ Nachweis säurefester Stäbchen (positiv)
- ❍ kein Nachweis säurefester Stäbchen (negativ)
- ❍ durchgeführt, aber Ergebnis unbekannt
- ❍ kein Nachweis durchgeführt

☐ weiteres Material ..... ❍ Nachweis säurefester Stäbchen (positiv)

❍ kein Nachweis säurefester Stäbchen (negativ)

❍ durchgeführt, aber Ergebnis unbekannt

❍ kein Nachweis durchgeführt

Nukleinsäurenachweis

❍ Material: ..... ❍ positiv ❍ negativ

❍ Material. ..... ❍ positiv ❍ negativ

Kultureller Nachweis

❍ Material: ..... ❍ positiv ❍ negativ

❍ Material. ..... ❍ positiv ❍ negativ

Information zur Resistenz (aus Kultur)

Erstrang-Medikamente	Empfindlich	Intermediär	Resistent	Ergebnis unbekannt	Keine Prüfung durchgeführt
Isoniazid (INH)	❍	❍	❍	❍	❍
Rifampicin (RMP)	❍	❍	❍	❍	❍
Pyrazinamid (PZA)	❍	❍	❍	❍	❍
Ethambutol (EMB)	❍	❍	❍	❍	❍

Zweitrang-Medikamente	Empfindlich	Intermediär	Resistent	Ergebnis unbekannt	Keine Prüfung durchgeführt
	❍	❍	❍	❍	❍
	❍	❍	❍	❍	❍
	❍	❍	❍	❍	❍
	❍	❍	❍	❍	❍
	❍	❍	❍	❍	❍

❍ Multi-Drug-Resistant (**MDR**)-Tuberkulose (Resistenz gegen Isoniazid und Rifampicin)

❍ Extensively drug-resistant (**XDR**)-Tuberkulose (Resistenzen gegen Isoniazid und Rifampicin, gegen Moxifloxacin und/oder Levofloxacin und gegen Bedaquilin und/oder Linezolid)

☐ Nachweis eines Resistenzgens mittels PCR: .....

Epidemiologische Informationen

Mögliche Expositionsorte:

1. .....

Aufenthalt von ..... (tt/mm/jjjj) bis ..... (tt/mm/jjjj)

2. .....

Aufenthalt von ..... (tt/mm/jjjj) bis ..... (tt/mm/jjjj)

Zugehörig zu Ausbruch ❍ Nein ❍ Ja: .....

Anzahl weiterer Erkrankter: .....

Weitere Notizen